

Họ, tên thí sinh: .....

Số báo danh: .....

Mã đề thi 209

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

 $H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;$   
 $Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.$ Câu 41. Hợp chất  $H_2NCH_2COOH$  có tên là

- A. alanin.      B. glyxin.      C. lysin.      D. valin.

Câu 42. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl du tạo ra chất khí?

- A.  $Ba(OH)_2$ .      B.  $Ca(NO_3)_2$ .      C.  $Na_2CO_3$ .      D.  $K_2SO_4$ .

Câu 43. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

- A. Glyxin.      B. Anilin.      C. Glucozơ.      D. Metylamin.

Câu 44. Cho Fe tác dụng với dung dịch  $HNO_3$  đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

- A.  $N_2O$ .      B.  $N_2$ .      C.  $NO_2$ .      D. NO.

Câu 45. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

- A. Mg.      B. Ag.      C. Cu.      D. Fe.

Câu 46. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch  $Ba(OH)_2$  tạo ra kết tủa?

- A.  $NaCl$ .      B.  $Ca(HCO_3)_2$ .      C.  $KCl$ .      D.  $KNO_3$ .

Câu 47. Công thức hóa học của natri đicromat là

- A.  $Na_2Cr_2O_7$ .      B.  $Na_2CrO_4$ .      C.  $NaCrO_2$ .      D.  $Na_2SO_4$ .

Câu 48. Khử hoàn toàn 32 gam  $CuO$  bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

- A. 12,8.      B. 25,6.      C. 19,2.      D. 6,4.

Câu 49. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?

- A.  $H_2S$  và  $N_2$ .      B.  $CO_2$  và  $O_2$ .      C.  $NH_3$  và  $HCl$ .      D.  $SO_2$  và  $NO_2$ .

Câu 50. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

- A.  $C_{15}H_{31}COOCH_3$ .      B.  $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ .  
C.  $(C_{17}H_{33}COO)_2C_2H_4$ .      D.  $CH_3COOCH_2C_6H_5$ .

Câu 51. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?


- A. Poliacrilonitrin.      B. Poli(etylen terephthalat).  
C. Polistiren.      D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 52. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là

- A. Al.      B. Ag.      C. Fe.      D. Cu.

Câu 53. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây?

- A.  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_{2(k)} + \text{H}_2\text{O}$
- B.  $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaOH} \xrightarrow{\text{t}\circ} \text{NH}_{3(k)} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- C.  $2\text{Fe} + 6\text{H}_2\text{SO}_4(\text{đặc}) \xrightarrow{\text{t}\circ} \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{SO}_{2(k)} + 6\text{H}_2\text{O}$
- D.  $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3(\text{loãng}) \longrightarrow 3\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_{(k)} + 4\text{H}_2\text{O}$



Câu 54. Cho 19,1 gam hỗn hợp  $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$  và  $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$  tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch  $\text{NaOH}$  1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

- A. 19,4.
- B. 16,6.
- C. 9,2.
- D. 17,9.

Câu 55. Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chúc, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch  $\text{HCl}$ , thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là

- A.  $\text{CH}_5\text{N}$  và  $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$ .
- B.  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  và  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$ .
- C.  $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$  và  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$ .
- D.  $\text{C}_3\text{H}_7\text{N}$  và  $\text{C}_4\text{H}_9\text{N}$ .

Câu 56. Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Ở điều kiện thường, chất béo  $(\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO})_3\text{C}_3\text{H}_5$  ở trạng thái rắn.
- B. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glicerol.
- C. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.
- D. Fructozơ có nhiều trong mật ong.

Câu 57. Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Kim loại cứng nhất là Cr.
- B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch  $\text{NaOH}$ .
- C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li.
- D. Kim loại Cu khử được ion  $\text{Fe}^{2+}$  trong dung dịch.

Câu 58. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch  $\text{HCl}$  dư, thu được 1,68 lít khí  $\text{H}_2$  (dktc). Khối lượng của Mg trong X là

- A. 0,60 gam.
- B. 0,42 gam.
- C. 0,90 gam.
- D. 0,48 gam.

Câu 59. Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch  $\text{HCl}$  3,65%. Kim loại X là

- A. K.
- B. Ba.
- C. Na.
- D. Ca.

Câu 60. Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

- A. 4.
- B. 2.
- C. 1.
- D. 3.

Câu 61. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch:  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{AgNO}_3$ ,  $\text{MgCl}_2$ . Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

- A. 4.
- B. 1.
- C. 3.
- D. 2.

Câu 62. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptit trong phân tử X là

- A. 1.
- B. 4.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 63. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch  $\text{NaOH}$ , đun nóng, thu được 9,2 gam glicerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là

- A. 85.
- B. 89.
- C. 101.
- D. 93.

Câu 64. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại cần vừa đủ 40 ml dung dịch  $\text{HCl}$  2M. Công thức của oxit là

- A.  $\text{CuO}$ .
- B.  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ .
- C.  $\text{MgO}$ .
- D.  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ .

Câu 65. Cho các phát biểu sau:

- (a) Điện phân dung dịch  $\text{NaCl}$  (diện cực tro), thu được Na tại catot.
- (b) Có thể dùng  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  làm mắt kính cứng của nước cứng tạm thời.
- (c) Thạch cao nung có công thức là  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .
- (d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .
- (e) Điều chế  $\text{Al}(\text{OH})_3$  bằng cách cho dung dịch  $\text{AlCl}_3$  tác dụng với dung dịch  $\text{NH}_3$ .

Số phát biểu đúng là

- A. 5.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 3.

Câu 66. Cho các phát biểu sau:

- (a) Dung dịch hỗn hợp  $\text{FeSO}_4$  và  $\text{H}_2\text{SO}_4$  làm mất màu dung dịch  $\text{KMnO}_4$ .
- (b)  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.
- (c)  $\text{Cr}(\text{OH})_3$  tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.
- (d)  $\text{CrO}_3$  là oxit axit, tác dụng với  $\text{H}_2\text{O}$  chỉ tạo ra một axit.

Số phát biểu đúng là

- A. 4.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 1.

Câu 67. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là

- A. Ala và Val.
- B. Gly và Val.
- C. Ala và Gly.
- D. Gly và Gly.

Câu 68. Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

- A. 33,250.
- B. 53,775.
- C. 61,000.
- D. 55,600.

Câu 69. Điện phân 200 ml dung dịch gồm  $\text{CuSO}_4$  1,25M và  $\text{NaCl}$  a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của a là

- A. 0,50.
- B. 1,00.
- C. 1,50.
- D. 0,75.

Câu 70. Cho các phát biểu sau:

- (a) Chất béo là trieste của glycerol với axit béo.
- (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
- (c) Glucosơ thuộc loại monosaccharit.
- (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
- (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  tạo hợp chất màu tím.
- (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

- A. 5.
- B. 4.
- C. 3.
- D. 2.

Câu 71. Cho a mol este X ( $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$ ) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

- A. 4.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 6.

Câu 72. Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol  $\text{CO}_2$  và 0,075 mol  $\text{H}_2\text{O}$ . Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

- A.  $\text{HCOOH}$  và  $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ .
- B.  $\text{C}_2\text{H}_3\text{COOH}$  và  $\text{CH}_3\text{OH}$ .
- C.  $\text{CH}_3\text{COOH}$  và  $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ .
- D.  $\text{HCOOH}$  và  $\text{C}_3\text{H}_5\text{OH}$ .

Câu 73. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X	Quỳ tím	Chuyển màu hồng
Y	Dung dịch $\text{I}_2$	Có màu xanh tím
Z	Dung dịch $\text{AgNO}_3$ trong $\text{NH}_3$	Kết tủa Ag
T	Nước brom	Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

- A. Anilin, tinh bột, glucosơ, axit glutamic.
- B. Axit glutamic, tinh bột, anilin, glucosơ.
- C. Axit glutamic, glucosơ, tinh bột, anilin.
- D. Axit glutamic, tinh bột, glucosơ, anilin.

Câu 74. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

- (1)  $X_1 + H_2O \xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân dung dịch}} X_2 + X_3 \uparrow + H_2 \uparrow$
- (2)  $X_2 + X_4 \longrightarrow BaCO_3 \downarrow + Na_2CO_3 + H_2O$
- (3)  $X_2 + X_3 \longrightarrow X_1 + X_5 + H_2O$
- (4)  $X_4 + X_6 \longrightarrow BaSO_4 \downarrow + K_2SO_4 + CO_2 \uparrow + H_2O$

Các chất  $X_2$ ,  $X_5$ ,  $X_6$  lần lượt là:

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| A. $NaOH$ , $NaClO$ , $KHSO_4$ .  | B. $NaHCO_3$ , $NaClO$ , $KHSO_4$ . |
| C. $NaOH$ , $NaClO$ , $H_2SO_4$ . | D. $KOH$ , $KClO_3$ , $H_2SO_4$ .   |

Câu 75. Cho các phát biểu sau:


- (a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước.
- (b) Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch hỗn hợp  $NaNO_3$  và  $H_2SO_4$  (loãng).
- (c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ.
- (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch  $FeCl_3$ , thu được dung dịch chứa ba muối.
- (e) Hỗn hợp Al và  $BaO$  (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư.
- (g) Lưu huỳnh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với  $CrO_3$ .

Số phát biểu đúng là

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 5. | B. 4. | C. 3. | D. 6. |
|-------|-------|-------|-------|

Câu 76. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Al và  $Al_2O_3$  trong 200 ml dung dịch  $HCl$  nồng độ  $a$  mol/l, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch  $NaOH$  1M vào X, lượng kết tủa  $Al(OH)_3$  (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch  $NaOH$  ( $V$  ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá trị của  $a$  là

- |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| A. 2,0. | B. 0,5. | C. 1,5. | D. 1,0. |
|---------|---------|---------|---------|



Câu 77. Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: dipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch  $NaOH$  dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng của  $CO_2$  và  $H_2O$  là 39,14 gam. Giá trị của m là

- |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. 22,64. | B. 25,08. | C. 16,78. | D. 20,17. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

Câu 78. Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp  $AgNO_3$  và  $Cu(NO_3)_2$ , thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch  $H_2SO_4$  (đặc, nóng, dư), thu được 6,384 lít khí  $SO_2$  (sản phẩm khử duy nhất của  $S^{+6}$ , ở dktc). Cho dung dịch  $NaOH$  dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| A. 60,87%. | B. 79,13%. | C. 70,00%. | D. 28,00%. |
|------------|------------|------------|------------|

Câu 79. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch  $NaOH$  1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí  $CO_2$  (dktc) và 19,44 gam  $H_2O$ . Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| A. 13,5. | B. 40,5. | C. 43,0. | D. 37,0. |
|----------|----------|----------|----------|

Câu 80. Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe,  $FeO$  và  $Fe_2O_3$  vào 1 lít dung dịch  $HNO_3$  1,7M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của  $N^{+5}$ , ở dktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| A. 3,92. | B. 9,52. | C. 4,48. | D. 6,72. |
|----------|----------|----------|----------|

----- HẾT -----